



rolax[®] PLUS
6H

رولاکس پلاس جی اچ[®]

اجزاء فراورده: ۵۰ گرم پودر برگ سنا (Cassia angustifolia)
استانداردشده: براساس حداقل ۱/۷۸٪ وزنی سنوزید B، استاندارد شده است.
شکل فراورده: قوطی ۵۰ گرمی به همراه پرورشور در جعبه مقوایی
موارد مصرف: سنا دارای اثرات ملینی و مسهلی می باشد که از آن در درمان یبوست استفاده می شود.

آثار درمانی و فارماکولوژیک:

برگ سنا از دسته ملین های محرک می باشد، گلیکوزیدهای آنتراکینونی سنا پس از هضم، هیدرولیز شده و آنتراکینون آزاد و فعال ایجاد می نماید. این عمل به این صورت انجام می شود که بخشی از گلیکوزیدهای آنتراکینونی از روده کوچک جذب شده و در کبد هیدرولیز می شود و آنتراکینون فعال حاصله به داخل کولون ترشح می شود. احتمالاً بخشی از گلیکوزیدهای آنتراکینونی سنا که در این مرحله جذب نشده اند به وسیله آنزیم های باکتریایی در کولون هیدرولیز می شود و آنتراکینون فعال تولید می کند. در مجموع اثر ملینی عمدتاً در کولون اعمال شده، به تحریک شبکه اوئر باخ توسط آنتراکینون های فعال در نتیجه افزایش حرکات دودی شکل روده، نسبت داده می شود. این ملین ها به طور خوراکی ۶ تا ۱۲ ساعت پس از تجویز اثر می کنند. آنتراکینون های آزاد در خون به گردش درآمده، توسط کلیه ها دفع شده و باعث تغییر رنگ ادرار می شود. این ترکیبات در شیر مادران شیرده و بزاق و صفرا نیز ترشح می شوند.

نحوه و مقدار مصرف: بزرگسالان روزانه یک قاشق چایخوری (معادل یک گرم از پودر که تقریباً دارای ۱۷ میلی گرم سنوزید B است) یک یا دو بار در روز، در مقداری آب گرم ریخته و میل شود.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

در صورت حساسیت به دارو، تهوع، استفراغ یا دیگر علائم آپاندیسیت، جراحی حاد شکمی، انسداد روده ای ناشی از سفت شدن مدفوع و سایر موارد انسدادی و درد غیر مشخص شکمی، این دارو منع مصرف دارد.
در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود. سنا جزء دسته C می باشد و در دوران بارداری نباید مصرف شود. در ضمن به دلیل ترشح مشتقات آنتراکینونی در شیر، در دوران شیردهی مصرف نشود.
مصرف سنا در کودکان زیر ۲ سال ممنوع است و کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال باید از دستور پزشک پیروی کنند.
در افراد سالمند میزان فراورده تجویز شده نصف دوز معمول است.
فراورده های ملینی نباید بیشتر از یک دوره یا یک تا دو هفته ای، بدون تجویز پزشک مصرف شوند.
در صورتیکه از داروهای آرامبخش و سداتیو استفاده می کنید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

تداخل دارویی:

این فراورده با گلیکوزیدهای قلبی مثل دیگوکسین، داروهای ضد آریتمی، استروژن، ایندومتاسین، نیفیدپین، داروهای مدر پایین آورنده پتاسیم مثل فوروزماید و هیدروکلرتیازید و آدنو کورتیکواستروئیدها و شیرین بیان تداخل دارد، با فاصله مصرف کنید.

عوارض جانبی:

سنا ممکن است سبب ناراحتی های شکمی خفیفی مثل قولنج یا کرامپ گردد. مصرف طولانی مدت یا بیش از دوز تجویزی می تواند سبب اسهال همراه با از دست دادن آب و الکترولیت ها به ویژه پتاسیم شود.

در صورت مصرف بیش از اندازه و طولانی مدت (به مدت یک سال یا بیشتر) گزارشات معدودی از آریتمی قلبی، نفروپاتی، ادم، پوکی استخوان، کولون اسهال، هیپوگاماگلوبولینا، هماجوری و ضعف عضلانی، پیگمانتاسیون ملانینی مخاط روده و آسیب بافتی وجود دارد.

شرایط نگهداری: دور از نور و رطوبت و گرما در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد در جعبه نگهداری شود.

نام و نشانی سازنده: قم، ۲۰ کیلومتری اتوبان قم-تهران، شهرک صنعتی شکوهیه، شرکت داروسازی قائم دارو. تلفن: ۰۲۵۳۳۳۴۰۲۳۴۰

منابع:

۱. PDR for herbal medicines, 4 th edition, published by: Medical Economics Company, Inc., at Montvale. P: 725 - 728

۲. فارماکوپه گیاهی ایران صفحات: ۴۴۶-۴۴۵

www.ghaemdarou.net
info@ghaemdarou.net

محصولی از
قائم دارو