



RULAX[®]

رولاکس جی اچ

فراورده طبیعی

اجزاء فراورده: ۵۰۰ میلی گرم پودر برگ سنا (Senna alexandrina)
استاندارد شده: براساس درصد گلیکوزیدهای آنتراسین بر مبنای سنوزید B معادل ۱۲/۵ میلی گرم در هر کپسول، استاندارد شده است.

شکل فراورده: ۳۰ عدد کپسول ۵۰۰ میلی گرمی
خواص دارویی: ملین، رفع یبوست

آثار درمانی و فارماکولوژیک:

برگ سنا از دسته ملین های محرک می باشد، گلیکوزیدهای آنتراکینونی سنا پس از هضم، هیدرولیز شده و آنتراکینون آزاد و فعال ایجاد می نماید. این عمل به این صورت انجام می شود که بخشی از گلیکوزیدهای آنتراکینونی از روده کوچک جذب شده و در کبد هیدرولیز می شود و آنتراکینون فعال حاصله به داخل کولون ترشح می شود. احتمالاً بخشی از گلیکوزیدهای آنتراکینونی سنا که در این مرحله جذب نشده اند به وسیله آنزیم های باکتریایی در کولون هیدرولیز می شود و آنتراکینون فعال تولید می کند. در مجموع اثر ملینی عمدتاً در کولون اعمال شده، به تحریک شبکه اوئرباخ توسط آنتراکینون های فعال در نتیجه افزایش حرکات دودی شکل روده، نسبت داده می شود. این ملین ها به طور خوراکی ۶ تا ۱۲ ساعت پس از تجویز اثر می کنند. آنتراکینون های آزاد در خون به گردش درآمده، توسط کلیه ها دفع شده و باعث تغییر رنگ ادرار می شود. این ترکیبات در شیر مادران شیرده و بزرگسالان و بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا، روزانه یک تا سه بار، هر بار یک کپسول توصیه می شود.

نحوه و مقدار مصرف: برای بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا، روزانه یک تا سه بار، هر بار یک کپسول توصیه می شود.

موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه:

- در صورت حساسیت به دارو، تهوع، استفراغ یا دیگر علائم آپاندیسیت، جراحی حاد شکمی، انسداد روده ای ناشی از سفت شدن مدفوع و سایر موارد انسدادی و درد غیر مشخص شکمی، این دارو منع مصرف دارد.
- در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود. سنا جزء دسته C می باشد و در دوران بارداری نباید مصرف شود. در ضمن به دلیل ترشح مشتقات آنتراکینونی در شیر، در دوران شیردهی مصرف نشود.
- مصرف سنا در کودکان زیر ۲ سال ممنوع است و کودکان ۱۲ تا ۱۳ سال باید از دستور پزشک پیروی کنند.
- در افراد سالمند میزان فروآورده تجویز شده نصف دوز معمول است.
- فراورده های ملینی نباید بیشتر از یک دوره یک تا دو هفته ای، بدون تجویز پزشک مصرف شوند.
- در صورتیکه از داروهای آرامبخش و سداتیو استفاده می کنید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

تداخل دارویی:

این فراورده با گلیکوزیدهای قلبی مثل دیگوکسین، داروهای ضد آریتمی، استروژن، ایندومتاسین، نیفیدپین، داروهای مدر پایین آورنده پتاسیم مثل فوروزماید و هیدروکلرتیازید و آدنو کورتیکواستروئیدها و شیرین بیان تداخل دارد. با فاصله مصرف کنید.

عوارض جانبی:

- سنا ممکن است سبب ناراحتی های شکمی خفیفی مثل قولنج یا کرامپ گردد. مصرف طولانی مدت یا بیش از دوز تجویزی می تواند سبب اسهال همراه با از دست دادن آب و الکترولیت ها به ویژه پتاسیم شود.
- در صورت مصرف بیش از اندازه و طولانی مدت (به مدت یک سال یا بیشتر) گزارشات معدودی از آریتمی قلبی، نفروپاتی، ادم، پوکی استخوان، کولون اسهال، هیپوگاماگلوبولینا، هماجوری و ضعف عضلانی، پیگمانتاسیون ملانینی مخاط روده و آسیب بافتی وجود دارد.

شرایط نگهداری: دور از نور و رطوبت و گرما در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد در جعبه نگهداری شود.

نام و نشانی سازنده: قم، ۲۰ کیلومتری اتوبان قم-تهران، شهرک صنعتی شکوهیه، شرکت داروسازی قائم دارو.
تلفن: ۰۲۵۳۳۳۴۰۲۳۳۴

منابع:

۱. PDR for herbal medicines, ۴ th edition, published by: Medical Economics Company, Inc, at Montvale. P: 725 - 728.

۲. فارماکوپه گیاهی ایران صفحات: 446-445.

www.ghaemdarou.net
info@ghaemdarou.net

مجموعه
قائم دارو